



Sportsmaster[®] CRF Mini

Active

Aktivní podpora růstu trávníku

15 | 6 | 15 | 6.0 | 2.0
N | P₂O₅ | K₂O | CaO | MgO



Složení

oxide		
N	Celkový dusík	15%
	Dusičnanový dusík (N-NO ₃)	0%
	Amoniakální dusík (N-NH ₄)	1.3%
	Močovinový dusík (N-Urea)	13.7%
	Dusík v organické formě	0%
P ₂ O ₅	Oxid fosforečný	6%
	vodorozpustný (P ₂ O ₅)	5.7%
K ₂ O	Oxid draselný	15%
	vodorozpustný (K ₂ O)	15.0%
CaO	Oxid vápenatý	6.0%
	vodorozpustný (CaO)	4.0%
MgO	Oxid hořečnatý	2.0%
	vodorozpustný (MgO)	2.0%

Popis

Ideální minigranulované hnojivo během celého aktivního vegetačního období, od jara do podzimu. Jeho složení obsahuje vyrovnaný poměr dusíku a draslíku doplněný trochou fosforu, který napomáhá stabilnímu a zdravému růstu. Navíc obsahuje hořčík pro intenzivní barvu a pro minimalizaci jakýchkoli známek stresu. Obsahuje také velké vápník pro tvorbu silných buněk, díky čemuž je váš trávník odolnější. Díky kombinaci konvenční a obalované technologie se dusík uvolňuje v oddělených intervalech. Technologie řízeného uvolňování živin Poly-S zajišťuje pravidelný růst bez výkyvů a neobalovaný materiál rychle oživení trávníku. Hustota pokrytí minigranulí aplikovaných na metr čtvereční se rychle projeví zlepšením barvy trávníku. Díky nízkým dávkám je hnojivo Sportsmaster CRF Mini mnohem efektivnější i z hlediska nákladů.

Výhody

- \\ Vyvážené NK hnojivo s obsahem P k použití na jaře a na podzim.
- \\ Přídavek hořčíku zajišťuje lepší zbarvení trávníku a maskuje příznaky zátěže.
- \\ Vysoký obsah vápníku posiluje buněčné stěny rostlin a zvyšuje odolnost trávníku vůči zátěži.

Návod k použití

- 1 Aplikujte na suché listy. Zálivka po aplikaci napomáhá rovnoměrnému rozptýlení a zrychluje počáteční účinek.
- 2 Aplikace by měla probíhat po provzdušňování jako je aerifikace dutými hroty, propichování a/nebo skarifikace, aby nedošlo k poškození granulí
- 3 Vyhněte se aplikaci za mrazu či sucha
- 4 Dojde-li k vysypání na chodník, beton, šaty apod., okamžitě odstraňte, produkt může způsobit skvrny
- 5 Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Dávkování

Doporučené dávkování:

20 – 35 g/m²

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Pozornost

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.