



Landscaper Pro

Spring & Summer

Ať to roste

20 | 0 | 7 | 9 | 3.0
N P2O5 K2O CaO MgO

2-3

Složení

Oxidy

N	Celkový dusík	20%
	Močovinový dusík (N-Urea)	20.0%
P2O5	Oxid fosforečný	0%
K2O	Oxid draselný	7%
	vodorozpustný (K ₂ O)	7.0%
CaO	Oxid vápenatý	9%
	vodorozpustný (CaO)	7.0%
MgO	Oxid hořečnatý	3.0%
	vodorozpustný (MgO)	2.5%

Popis

Vysoce účinné hnojivo pro hlavní růstovou fázi

Výhody

- \\ Výborný poměr cena/výkon
- \\ Nepřetržité uvolňování živin po dobu 2-3 měsíců
- \\ Optimální přísun živin pro zlepšení kvality trávníku

Návod k použití

- 1 Aplikujte na suché listy. Zálivka po aplikaci napomáhá rovnoměrnému rozptýlení, zrychluje počáteční účinek a omezuje stopy po obsluze. Vyhněte se aplikaci za mrazu či sucha.
- 2 Aplikace by měla probíhat po provzdušňování jako je aerifikace dutými hroty, propichování a/nebo skarifikace, aby nedošlo k poškození granulí.
- 3 Pokud dojde k rozsypaní na chodníky, beton, šaty apod., okamžitě omyjte, protože produkt může způsobit odbarvení.
- 4 Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.
- 5 Nespotřebované nebo poškozené pytle je nutné pečlivě uzavřít.
- 6 Skladujte v suchu.

Doporučené použití

JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC

Dávkování

Doporučená dávka:

25 - 35 g/m²

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Upozornění

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.